




Process for the production of 1,3-diketones

Patent number: EP0454624
Publication date: 1991-10-30
Inventor: DREWES ROLF DR (DE); FRIEDRICH HANS-HELMUT (DE); MEHNER HANS-LUDWIG (DE)
Applicant: CIBA GEIGY AG (CH)
Classification:
- international: C07C45/45; C07C45/72; C07C49/76
- european: C07C45/45F; C07C49/76; C07C49/782; C07C49/82; C07C49/84; C07C319/20
Application number: EP19910810290 19910417
Priority number(s): CH19900001425 19900426

Also published as:

 JP4225936 (A)
 EP0454624 (B)

Cited documents:

 DE3302123
 US4387089
 DE2439282
 FR1202737
 US3004932

[Report a data error here](#)

Abstract of EP0454624

A process for the preparation of 1,3-diketones of the formula I is described, in which R1 and R2, independently of one another, represent substituted C1-C20-alkyl, phenyl, phenyl which is substituted by halogen, hydroxyl, NO2, C1-C4-alkyl and/or C1-C4-alkoxy, C7-C9-phenylalkyl or a radical of the formula -A-X-R4 (II) in which A denotes C1-C10-alkyl, phenyl, (C1-C4-alkyl)phenyl, phenyl which is substituted by halogen, hydroxyl, NO2 and/or C1-C4-alkoxy, or denotes C7-C9-phenylalkyl or C1-C10-alkyl which is substituted by hydroxyl, halogen or alkoxy, X represents oxygen or sulphur and R4 denotes hydrogen, C1-C15-alkyl, phenyl, (C1-C4-alkyl)phenyl, phenyl which is substituted by halogen, hydroxyl, NO2 and/or C1-C4-alkoxy or denotes C7-C9-phenylalkyl, and R3 represents hydrogen, C1-C20-alkyl, phenyl, (C1-C4-alkyl)phenyl, phenyl which is substituted by halogen, hydroxyl, C1-C4-alkyl, NO2 and/or C1-C4-alkoxy or represents C7-C9-phenylalkyl. The process consists in Claisen condensation of a ketone of the formula I with an ester of the formula IV or V in which R5 denotes C1-C4-alkyl, phenyl or phenyl which is substituted by halogen, C1-C4-alkyl or hydroxyl, the reaction being carried out in inert solvents or solvent mixtures in which at least 8% of the base added as a catalyst, i.e. a C1-C5-alkali metal alcoholate or alkaline earth metal alcoholate or alkali metal hydride or alkaline earth metal hydride, are soluble, with the exclusion of dimethyl sulphoxide and alcohols.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer : 0 454 624 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer : 91810290.6

(51) Int. Cl.⁵ : C07C 45/72, C07C 45/45,
C07C 49/76

(22) Anmeldetag : 17.04.91

(30) Priorität : 26.04.90 CH 1425/90

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung :
30.10.91 Patentblatt 91/44


(84) Benannte Vertragsstaaten :
BE DE FR GB IT

(71) Anmelder : CIBA-GEIGY AG
Klybeckstrasse 141
CH-4002 Basel (CH)

(72) Erfinder : Drewes, Rolf, Dr.
Am Buchacker 1
W-6145 Lindenfels (DE)
Erfinder : Friedrich, Hans-Helmut
Am Rauenstein 8
W-6147 Lautertal 2 (DE)
Erfinder : Mehner, Hans-Ludwig
Guldenweg 9
W-6840 Lampertheim (DE)

(54) Verfahren zur Herstellung von 1,3-Diketonen.

(57) Es wird ein Verfahren zur Herstellung von 1,3-Diketonen der Formel I



beschrieben, worin

R₁ und R₂ unabhängig voneinander für substituiertes C₁-C₂₀-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, NO₂, C₁-C₄-Alkyl und/oder C₁-C₄-Alkoxy substituiertes Phenyl, C₇-C₉-Phenylalkyl oder für einen Rest der Formel II stehen



wobei

A C₁-C₁₀-Alkyl, durch Phenyl, (C₁-C₄-Alkyl)-phenyl, durch Halogen, Hydroxy, NO₂ und/oder C₁-C₄-Alkoxy substituiertes Phenyl oder C₇-C₉-Phenylalkyl oder durch Hydroxy, Halogen oder Alkoxy substituiertes C₁-C₁₀-Alkyl bedeutet,

X für Sauerstoff oder Schwefel steht und

R₄ Wasserstoff, C₁-C₁₅-Alkyl, Phenyl, (C₁-C₄-Alkyl)-phenyl, durch Halogen, Hydroxy, NO₂ und/oder C₁-C₄-Alkoxy substituiertes Phenyl oder C₇-C₉-Phenylalkyl bedeutet und

R₃ Wasserstoff, C₁-C₂₀-Alkyl, Phenyl, (C₁-C₄-Alkyl)-phenyl, durch Halogen, Hydroxy, C₁-C₄-Alkyl, NO₂ und/oder C₁-C₄-Alkoxy substituiertes Phenyl oder C₇-C₉-Phenylalkyl darstellt.

Das Verfahren besteht in einer Claisen-Kondensation eines Ketons der Formel III




und eines Esters der Formel IV



bzw. V

EP 0 454 624 A1



worin R_5 C_1 - C_4 -Alkyl, Phenyl oder durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl oder Hydroxy substituiertes Phenyl bedeutet, wobei in inerten Lösungsmitteln oder Lösungsmittelgemischen, in denen die als Katalysator zugesetzte Base, ein C_1 - C_5 -Alkali- oder Erdalkalimetallalkoholat oder Alkali- oder Erdalkalimetallhydrid, zu mindestens 8 % löslich ist, gearbeitet wird, wobei Dimethylsulfoxid und Alkohole ausgeschlossen sind.

Verfahren zur Herstellung von 1,3-Diketonen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 1,3-Diketonen durch Claisen-Kondensation von Ketonen mit Estern in Gegenwart von Alkali- oder Erdalkalimetallhydriden oder Alkali- und Erdalkalimetallalkoholaten in organischen Lösungsmitteln oder Lösungsmittelgemischen, mit Ausnahme von Dimethylsulfoxid und Alkoholen, in denen die Base zu mindestens 8 % löslich ist.

1,3-Diketone sind als wertvolle Costabilisatoren für chlorhaltige Polymere, insbesondere Polyvinylchlorid, die gegen schädigenden Einfluss von Wärme und/oder Licht geschützt werden müssen, aus der Literatur bekannt. Ausserdem sind 1,3-Diketone wichtige Ausgangsstoffe und Zwischenprodukte zur Synthese von Heterocyclen. Die Claisen-Kondensation ist als Herstellungsmethode für 1,3-Diketone allgemein bekannt und in zahlreichen Lehrbüchern der organischen Chemie, wie z.B. Organikum, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin (1969), S. 580, 632, 658, J.B. Hendrickson, D.J. Cram, G.S. Hammond, Organic Chemistry, McGraw-Hill S. 522, 524, 525 oder J. March, Advanced Organic Chemistry, J. Wiley & Sons (1985), S. 437-39, 835 beschrieben.


Normalerweise wird die Reaktion zur Herstellung der Diketone in einem inerten organischen Lösungsmittel in Gegenwart von Alkalimetallen, Alkalimetallalkoholaten oder Alkalimetallhydriden als Base durchgeführt. So ist in der US-A 3,004,932 die Herstellung von ungesättigten β -Diketonen mit Alkalimetallalkoholaten in Diethylether veröffentlicht. Um die Diketone in reiner Form zu erhalten, wird dort eine Methode der Isolierung über die Ferri-Komplexe beschrieben.

In der FR-A 1 202 737 wird die Durchführung der Claisen-Kondensation in Alkoholen als Lösungsmittel mit in Wasser schwerlöslichen Alkalimetallalkoholat-Basen, die mindestens 5 Kohlenstoffatome enthalten, beschrieben.

Da in den bekannten Verfahren der Claisen-Kondensation hohe Ueberschüsse an Keton eingesetzt werden müssen und lange Reaktionszeiten erforderlich sind, besteht ein Interesse an verbesserten Verfahren zur Durchführung dieser Reaktion. Ausserdem ist die bisher angewandte übliche Methode der Isolierung und Reinigung der synthetisierten Diketone aufwendig. So ist es für die industrielle Anwendung von Vorteil, ein vereinfachtes Verfahren einzuführen.

Es wurde nun überraschenderweise gefunden, dass durch die Verwendung von organischen inerten Lösungsmitteln oder Lösungsmittelgemischen, in denen die zugesetzten Basen zu mindestens 8 % löslich sind, das Verfahren besonders vorteilhaft durchzuführen ist. Es kann z.B. die Reaktionszeit verkürzt werden. Es werden hohe Ausbeuten und Reinheiten erzielt.

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von linearen 1,3-Diketonen der allgemeinen Formel I



worin

R_1 und R_2 unabhängig voneinander für C_1 - C_{20} -Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, NO_2 , C_1 - C_4 -Alkyl und/oder C_1 - C_4 -Alkoxy substituiertes Phenyl, C_7 - C_9 -Phenylalkyl oder für einen Rest der Formel II stehen



wobei

A C_1 - C_{12} -Alkylen, Phenylen, durch Halogen, Hydroxy, NO_2 , C_1 - C_4 -Alkyl und/oder C_1 - C_4 -Alkoxy substituiertes Phenylen oder durch Hydroxy, Halogen oder/und Alkoxy substituiertes C_1 - C_{12} -Alkylen bedeutet,


X für Sauerstoff oder Schwefel steht und

R_4 Wasserstoff, C_1 - C_{18} -Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, C_1 - C_4 -Alkyl, NO_2 und/oder C_1 - C_4 -Alkoxy substituiertes Phenyl oder C_7 - C_9 -Phenylalkyl bedeutet und


R_3 Wasserstoff, C_1 - C_{20} -Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, C_1 - C_4 -Alkyl, NO_2 und/oder C_1 - C_4 -Alkoxy substituiertes Phenyl oder C_7 - C_9 -Phenylalkyl darstellt, durch Claisen-Kondensation von Ketonen der Formel III



mit Estern der Formel IV



10 worin R_5 für C_1 - C_5 -Alkyl, Phenyl, oder durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl oder Hydroxy substituiertes Phenyl steht; oder, wenn R_2 in Formel I $-(\text{CH}_2)_m\text{OH}$ bedeutet, auch mit cyclischen Estern der Formel V



15 in der m 2 bis 10 bedeutet,
20 in Gegenwart eines Alkali- oder Erdalkalimetallhydrids oder C_1 - C_5 -Alkali- oder Erdalkalimetallalkoholats als Base, dadurch gekennzeichnet, dass man die Umsetzung in einem inerten organischen Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch, in denen die Base zu mindestens 8 % löslich ist, durchführt, wobei das Lösungsmittel(gemisch) kein Dimethylsulfoxid ist (enthält) und das Lösungsmittel nicht aus einem Alkohol besteht.

25 R_1 und R_2 als C_1 - C_{20} -Alkyl können linear oder verzweigt sein und beispielsweise Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, tert-Butyl, n-Pentyl, Isopentyl, n-Hexyl, n-Heptyl, n-Octyl, Isooctyl, n-Nonyl, Decyl, Undecyl, Dodecyl, Tridecyl, Tetradecyl, Pentadecyl, Hexadecyl, Heptadecyl, Octadecyl, Nonadecyl oder Eicosyl, bevorzugt C_1 - C_{18} -Alkyl, insbesondere z.B. Methyl, Isopentyl, n-Nonyl, Pentadecyl oder Heptadecyl bedeuten.

Ist R_1 oder R_2 substituiertes Phenyl, enthält letzteres z.B. 1 bis 3, insbesondere 1 oder 2 Substituenten.

30 R_1 und R_2 als $(\text{C}_1$ - C_4 -Alkyl)-phenyl können beispielsweise für mit 1-3, insbesondere 1 oder 2 Alkylgruppen, vor allem mit Methylgruppen substituiertes Phenyl stehen. Beispiele dafür sind Toly, Xylyl oder Mesityl.

R_1 und R_2 als durch Halogen substituiertes Phenyl können beispielsweise einen ein- oder mehrfach durch Fluor, Chlor, Brom oder Iod, insbesondere Chlor oder Brom substituierten Phenylring bedeuten, wie z.B. Chlorphenyl oder Dichlorphenyl.

35 C_1 - C_4 -Alkoxy bedeutet beispielsweise Methoxy, Ethoxy, Propyloxy oder Butoxy, ein entsprechend substituiertes Phenyl ist beispielsweise Methoxyphenyl.

R_1 und R_2 als C_7 - C_9 -Phenylalkyl stehen z.B. für Benzyl, Phenylethyl, α -Methylbenzyl, 3-Phenylpropyl oder α,α -Dimethylbenzyl, bevorzugt ist Benzyl.

Bevorzugt sind R_1 und R_2 C_1 - C_{18} -Alkyl, Phenyl, $(\text{C}_1$ - C_4 -Alkyl)phenyl oder -A-X- R_4 .

40 A als C_1 - C_{12} -Alkylen kann beispielsweise ein lineares oder verzweigtes, vorzugsweise lineares, Alkylen bedeuten. Beispiele für solche Reste ergeben sich aus den obigen Beispielen für Alkyl als R_1 und R_2 bis zur entsprechenden Anzahl der C-Atome durch Anfügen des Suffixes -en. Bevorzugt ist C_1 - C_8 -Alkylen, insbesondere n-Propylen oder n-Pentylen.

R_4 als C_1 - C_{18} -Alkyl kann z.B. für lineares oder verzweigtes Alkyl stehen wie beispielsweise für R_1 und R_2 beschrieben bis zur entsprechenden Anzahl der C-Atome.

45 R_4 als substituiertes Phenyl oder C_7 - C_9 -Phenylalkyl kann die gleichen Bedeutungsmöglichkeiten haben wie für R_1 und R_2 beschrieben.

R_4 ist bevorzugt Wasserstoff, C_1 - C_{18} -Alkyl oder Phenyl.

A als gegebenenfalls substituiertes Phenyl ist vorzugsweise o- oder p-Phenylen, insbesondere unsubstituiertes Phenylen.

50 R_3 als C_1 - C_{20} -Alkyl, substituiertes Phenyl oder C_7 - C_9 -Phenylalkyl kann die gleichen Bedeutungsmöglichkeiten haben wie für R_1 und R_2 beschrieben, bevorzugt ist C_1 - C_4 -Alkyl.

R_3 steht bevorzugt für Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl, ganz besonders bevorzugt ist R_3 Wasserstoff.

R_5 als C_1 - C_5 -Alkyl bedeutet beispielsweise Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, tert-Butyl, n-Pentyl oder Isopentyl, bevorzugt ist Methyl.

55 R_5 als $(\text{C}_1$ - C_4 -Alkyl)-phenyl kann die gleichen Bedeutungsmöglichkeiten haben wie für R_1 und R_2 beschrieben.

Bei dem verwendeten Alkalimetallhydrid handelt es sich beispielsweise um Lithiumhydrid, Natriumhydrid oder Kaliumhydrid, insbesondere Natriumhydrid und Kaliumhydrid, ganz besonders bevorzugt um Natriumhy-

drid.

Beispiele für Erdalkalihydride sind Magnesiumhydrid und Calciumhydrid. Bevorzugt sind Alkalimetallhydride.

Beispiele für C₁-C₅-Alkalimetallalkoholate sind LiOCH₃, NaOCH₃, KOCH₃, LiOC₂H₅, NaOC₂H₅, KOC₂H₅,
 5 LiOn-C₃H₇, NaOn-C₃H₇, KOn-C₃H₇, LiOi-C₃H₇, NaOi-C₃H₇, KOi-C₃H₇, LiOn-C₄H₉, NaOn-C₄H₉, KOn-C₄H₉, LiOi-C₄H₉,
 NaOi-C₄H₉, KOi-C₄H₉, LiOtert-C₄H₉, NaOtert-C₄H₉, KOtert-C₄H₉, LiOn-C₅H₁₁, NaOn-C₅H₁₁, KOn-C₅H₁₁,
 LiOi-C₅H₁₁, NaOi-C₅H₁₁, KOi-C₅H₁₁, LiOtert-C₅H₁₁, NaOtert-C₅H₁₁, KOtert-C₅H₁₁.

Entsprechende Erdalkalimetallalkoholate sind beispielsweise Mg(OCH₃)₂, Ca(OCH₃)₂, Mg(OC₂H₅)₂,
 Ca(OC₂H₅)₂, Mg(On-C₃H₇)₂, Ca(On-C₃H₇)₂, Mg(Oi-C₃H₇)₂, Ca(Oi-C₃H₇)₂, Mg(On-C₄H₉)₂, Ca(On-C₄H₉)₂,
 10 Mg(Otert-C₄H₉)₂, Ca(Otert-C₄H₉)₂, Mg(Oi-C₄H₉)₂, Ca(Oi-C₄H₉)₂, Mg(On-C₅H₁₁)₂, Ca(On-C₅H₁₁)₂, Mg(Oi-C₅H₁₁)₂,
 Ca(Oi-C₅H₁₁)₂, Mg(Otert-C₅H₁₁)₂, Ca(Otert-C₅H₁₁)₂, insbesondere Magnesiumalkoholate.

Bevorzugt werden Alkalimetallalkoholate, insbesondere Na-Alkoholate.

Als unter den Reaktionsbedingungen inerte organische Lösungsmittel kommen beispielsweise lineare oder cyclische Ether, aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe oder cyclische oder lineare Amide in Frage.

15 Lineare oder cyclische Ether können beispielsweise Mono-, Di- Tri- oder Polyether sein. Beispiele dafür sind: Diethylether, Diisopropylether, Methyl-tert-butylether, Dibutylether, Ethylenglycoldimethylether, Diethylenglycoldimethylether, Tetrahydrofuran, Tetrahydropyran, Dioxan oder Dioxolan. Bevorzugt sind cyclische Ether und höhere lineare Ether (z.B. ab 5 C-Atomen), insbesondere Dioxan, Tetrahydrofuran oder Methyl-tert-butylether. Es können jeweils auch Mischungen dieser Lösungsmittel verwendet werden.

20 Als aliphatische Kohlenwasserstoffe werden beispielsweise Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Cyclohexan, Decalin, Petrolether oder Mischungen davon verwendet. Zweckmässig verwendete aromatische Kohlenwasserstoffe sind beispielsweise Benzol, Toluol oder Xylol, bevorzugt ist Toluol.

Als cyclisches oder lineares Amid kommt z.B. N-Methyl-Pyrrolidon in Frage.

25 Bevorzugt sind als inerte organische Lösungsmittel cyclische oder lineare Ether, oder cyclische oder lineare Amide.

Erfindungswesentlich ist, dass das verwendete Lösungsmittel die Base unter den Reaktionsbedingungen zu mindestens 8 Gew.% löst. Die Auswahl von brauchbaren Lösungsmitteln hängt somit von der verwendeten Base (unterschiedliche Löslichkeiten) sowie von der Reaktionstemperatur ab. Somit können einige der oben beispielhaft aufgezählten Lösungsmittel für bestimmte Basen oder/und Reaktionstemperaturen brauchbar
 30 sein, für andere hingegen nicht.

Das Reaktionsgemisch kann auch geringe Anteile des zum jeweils verwendeten Alkalialkoholat korrespondierenden Alkohols enthalten, beispielsweise weniger als 5 %, insbesondere weniger als 1 %. Besonders zweckmässig enthält das Reaktionsgemisch keinen Alkohol.

Von besonderem Interesse ist die Herstellung von Verbindungen, worin

35 R₁ und R₂ unabhängig voneinander C₁-C₂₀-Alkyl, Phenyl, (C₁-C₄-Alkyl)-phenyl oder einen Rest der Formel II bedeuten,

A für C₁-C₈-Alkylen steht,

R₄ Wasserstoff, C₁-C₁₈-Alkyl, Phenyl oder (C₁-C₄-Alkyl)-phenyl darstellt und

R₃ für Wasserstoff und C₁-C₄-Alkyl steht.

40 Bevorzugt werden Verbindungen der Formel I hergestellt, worin

R₁ und R₂ unabhängig voneinander C₁-C₁₈-Alkyl, Phenyl oder einen Rest der Formel II bedeuten,

R₄ Wasserstoff, Phenyl oder C₁-C₁₈-Alkyl darstellt und

R₃ für Wasserstoff steht.

Bevorzugt sind auch Verbindungen der Formel I, worin

45 R₁ und R₂ Phenyl oder einen Rest der Formel II bedeuten,

R₄ Phenyl und

X O bedeuten.

Besonders bevorzugt ist ein Verfahren, worin die organischen inerten Lösungsmittel cyclische oder lineare Ether sind.

50 Ganz besonders bevorzugt ist ein Verfahren, worin die inerten organischen Lösungsmittel cyclische Ether (insbesondere Dioxan und Tetrahydrofuran) oder Methyl-tert-butylether sind.

Zweckmässig ist die Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens bei Temperaturen zwischen -20 und +70°C. Bevorzugt liegen die Reaktionstemperaturen z.B. zwischen -5 und +40°C.

Die Reaktionszeiten des oben beschriebenen Verfahrens zur Claisen-Kondensation können in weiten
 55 Grenzen schwanken, liegen im allgemeinen aber zwischen 0,5 und 5,0 Stunden.

Als Säure zur Hydrolyse kommen beispielsweise Ameisensäure, Essigsäure, Phosphorsäure, Salzsäure oder Schwefelsäure in Frage, bevorzugt sind Salzsäure und Schwefelsäure.

Wie bereits eingangs erwähnt, stellen die erfindungsgemäss herstellbaren linearen 1,3-Diketone wertvolle

Costabilisatoren für chlorhaltige Polymerisate, die gegen schädigenden Einfluss von Wärme und/oder Licht geschützt werden müssen, sowie wertvolle Ausgangsstoffe und Zwischenprodukte zur Synthese von Heterocyclen, dar. Es besteht daher ein Interesse daran, diese Diketone in möglichst einfachen Verfahren mit wenig Energieaufwand in hohen Ausbeuten herzustellen.

5 Das erfindungsgemässe Verfahren eröffnet einen technisch besonders günstigen und wirtschaftlichen Weg zu deren Herstellung.


Erfindungswesentlich ist, dass im oben beschriebenen Verfahren ein inertes organisches Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch verwendet wird, in dem die eingesetzte Base unter den Reaktionsbedingungen zu mindestens 8 % löslich ist. Bevorzugt ist eine Löslichkeit von mindestens 10 %, vorzugsweise mindestens 15%,
10 insbesondere mindestens 20 %.

Ein wichtiger Vorteil des erfindungsgemässen Verfahrens liegt darin, dass zu seiner Durchführung relativ niedrige Reaktionstemperaturen erforderlich sind, ein wichtiger Aspekt der Energieersparnis für die industrielle Anwendung. So kann das Verfahren z.B. bei -20 bis 70°C, vorzugsweise bei -5° bis +40°C durchgeführt werden. In den bisher bekannten Verfahren ist die Verwendung eines bis zu 100%igen Ueberschusses an Keton zur Erlangung guter Ausbeuten erforderlich. Als besonderer technischer Vorteil des erfindungsgemässen Verfahrens ist daher auch die mögliche Erniedrigung des Edukt- und Basen-Ueberschusses im Vergleich zu den
15 bisher bekannten Verfahren zu nennen. So ist es möglich, mit dem erfindungsgemässen Verfahren auch mit annähernd stöchiometrischen Mengen oder geringen Ueberschüssen an Ester hohe Ausbeuten zu erzielen.

Die benötigte Base und die Ester-Komponente setzt man zweckmässig in einer Menge von 0,5- 1,5 Mol, bevorzugt von 0,65-1,25 Mol, insbesondere von 0,9-1,2 Mol, bezogen auf 1 Mol Keton ein.

Die Reaktion wird in an sich bekannter Weise durchgeführt, indem man z.B. die Base im Lösungsmittel vorlegt und die Ester- und Ketonkomponente nacheinander oder gleichzeitig zugibt. Uebliche Operationen wie Rühren des Reaktionsgemisches sind von Vorteil.


Wie dem Fachmann bekannt, können die Verbindungen der Formel I selbstverständlich teilweise oder ganz
25 in den tautomeren Formen vorliegen nach dem Gleichgewicht:



* Die nachfolgenden Beispiele erläutern das erfindungsgemässe Verfahren weiter. Darin sowie in der übrigen Beschreibung und den Patentansprüchen bedeuten Teile Gewichtsteile und Prozentangaben Gewichtsprozent, sofern nichts anderes angegeben ist.

Beispiel 1:

40



45


In einem 0,5 l Sovirel-Reaktor (doppelwandiges Reaktionsgefäss) mit Rührer, Thermometer und Tropftrichter werden 31,7 g Natrium-tert-butylat und 200 g Methyl-tert-butylether vorgelegt und auf 0°C abgekühlt. Anschliessend werden 45 g Benzoesäuremethylester und 36 g Acetophenon als Gemisch über einen Zeitraum
50 von 35 Minuten eingetropft. Das Reaktionsgemisch wird dann 45 Minuten bei 30°C gerührt, das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer bei einer Badtemperatur von < 60°C abdestilliert und der Rückstand mit 800 ml Wasser gelöst. Anschliessend wird mit verdünnter Salzsäure angesäuert, der Niederschlag abfiltriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet.

Ausbeute: 62,1 g \pm 92,3 % der Theorie.

55 Schmelzpunkt: 72-75°C.

Beispiel 2:

5




10 In eine Apparatur wie in Beispiel 1 beschrieben werden 31,7 g Natrium-tert-butylat und 200 g wasserfreies Tetrahydrofuran vorgelegt, auf 15°C abgekühlt und innerhalb 50 Minuten ein Gemisch aus 54,8 g Phenoxyessigsäuremethylester und 36 g Acetophenon bei 15°C unter Rühren eingetropft. Anschliessend wird das Gemisch jeweils 30 Minuten bei 15°C und 30°C nachgerührt. Dann werden die flüchtigen Anteile im Vakuum mittels Rotationsverdampfer abdestilliert, der Rückstand mit 500 ml Eiswasser aufgenommen, mit 60 g 25%iger Schwefelsäure angesäuert und der ausgefallene Festkörper abgesaugt, mit Wasser gewaschen und getrocknet.

15 Ausbeute: 73,6 g \pm 96,5 % der Theorie, gelbe Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 72-74°C.

Nach dem Umkristallisieren aus Isopropanol/Wasser erhält man ein Produkt mit dem Schmelzpunkt 81-82°C.

Beispiel 3:

20



25


30 In einem 0,5 l-Sovirel-Kolben (doppelwandiges Reaktionsgefäss) mit Rührer, Thermometer, Tropftrichter und Destillationsvorlage werden 52,9 g Natrium-tert.-butylat (0,55 mol) und 300,0 g Tetrahydrofuran (THF) (Wassergehalt < 0,01 %) vorgelegt und auf 0°C gekühlt. Bei dieser Temperatur wird eine Lösung von 60,0 g Acetophenon (99 %, 0,50 mol), 57,7 g ϵ -Caprolacton (99 %, 0,50 mol) und 30,0 g THF unter Rühren im Verlauf einer Stunde zudosiert. Dann wird 30 Minuten bei 0°C und anschliessend 2 Stunden bei 20°C nachgerührt. Dann werden bei 45°C und erniedrigtem Druck (30 mbar) ca. 330 g Lösungsmittel abdestilliert.

35 Der Rückstand wird auf 30°C gekühlt und mit 300 g Wasser versetzt. Die Lösung wird 3 mal mit je 70 ml Xylol extrahiert. Dann wird die wässrige Phase auf 1200ml verdünnt und mit Salzsäure auf pH ~ 5-6 eingestellt. Das Produkt fällt aus, wird abfiltriert, mit 100 ml Wasser gewaschen und getrocknet.

Ausbeute: 76,3 g \pm 65,8 % der Theorie, gelbliche Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 46-49°C.

Beispiel 4:

40



45

* -tertC₁₂H₂₅ = isomeres Gemisch mit der Hauptkomponente
-C(CH₃)₂-CH₂-C(CH₃)₂-CH₂-C(CH₃)₃

50 In einem 0,5 l-Sovirel-Kolben (doppelwandiges Reaktionsgefäss) mit Rührer, Thermometer, Tropftrichter und Kühler werden 37 g Natrium-tert-amylat in 200 g Dioxan suspendiert. Anschliessend wird ein Gemisch aus 11,6 g Aceton und 60,4 g 4-(tert-Dodecylmercapto)-buttersäuremethylester innerhalb von 25 Minuten bei 15°C zugetropft. Man rührt 15 Minuten bei 15°C und jeweils 45 Minuten bei 20 und 30°C. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer eingeeengt, der Rückstand in 500 ml Wasser aufgenommen, angesäuert und anschliessend dreimal mit Ether extrahiert. Die gesammelten organischen Phasen werden mit wenig Wasser und NaHCO₃-Lösung gewaschen, über NaSO₄ getrocknet, eingeeengt und der Rückstand destilliert.

55

Kp_(0,3 bar): 138-142°C

Brechungsindex: n_D(20) = 1,4904

Ausbeute: 58,4 g (90 % d. Theorie).

Beispiele 5-10:

Die in der folgenden Tabelle 1 angegebenen Verbindungen werden analog zur Vorschrift des Beispiels 2 hergestellt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Tabelle 1:

Beispiel Nr.	Verbindung	Lösungs- mittel	Base	Ausbeute [%]	Reinigung	Analytische Daten Schmelzpunkt/Siedepunkt Brechungsindex
5		Tetra- hydro- furan	$t\text{-C}_5\text{H}_{11}\text{-ONa}$	82,7	A	76 - 77 °C
6		Dioxan	$t\text{-C}_4\text{H}_9\text{-ONa}$	67,2	A	70 - 78 °C
7		Dioxan	$t\text{-C}_5\text{H}_{11}\text{-ONa}$	87,0	A	47 - 48 °C
8		Dioxan	$t\text{-C}_3\text{H}_7\text{-ONa}$	55,0 laut Gas- chromato- graphie	-	-
9		Dioxan	$t\text{-C}_4\text{H}_9\text{-ONa}$	75,0	B	Kp _{0,3} : 98 - 103 °C n_D^{20} : 1,5546
10		Tetra- hydro- furan	$t\text{-C}_4\text{H}_9\text{-ONa}$	75,0	B	Kp _{0,3} : 139 - 141 °C Smp.: 37 - 39 °C

A Umkristallisation aus i-Propanol

B Destillation


Beispiel 11:

Die in Beispiel 1 beschriebene Herstellung von Dibenzoylmethan wird mit verschiedenen Lösungsmitteln durchgeführt und die Löslichkeit der Base im Lösungsmittel, sowie die Ausbeute an Dibenzoylmethan werden bestimmt.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgelistet.

Tabelle 2

Beispiel	Lösungsmittel (200 g)	Temperatur in °C	Löslichkeit von Natrium- tert-butylat in %	Ausbeute in %
5a	Methyl-tert-butylether	0	27,3	92,3
5b	Tetrahydrofuran	0	28,1	91,9
5c	Dioxan	20	10,8	94,7

Patentansprüche**1. Verfahren zur Herstellung von linearen 1,3-Diketonen der allgemeinen Formel I**

worin

R₁ und R₂ unabhängig voneinander für C₁-C₂₀-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, NO₂, C₁-C₄-Alkyl und/oder C₁-C₄-Alkoxy substituiertes Phenyl, C₇-C₉-Phenylalkyl oder für einen Rest der Formel II stehen



wobei

A C₁-C₁₂-Alkylen, Phenylen, durch Halogen, Hydroxy, NO₂, C₁-C₄-Alkyl und/oder C₁-C₄-Alkoxy substituiertes Phenylen oder durch Hydroxy, Halogen oder/und Alkoxy substituiertes C₁-C₁₂-Alkylen bedeutet,

X für Sauerstoff oder Schwefel steht und

R₄ Wasserstoff, C₁-C₁₈-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, C₁-C₄-Alkyl, NO₂ und/oder C₁-C₄-Alkoxy substituiertes Phenyl oder C₇-C₉-Phenylalkyl bedeutet und

R₃ Wasserstoff, C₁-C₂₀-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, C₁-C₄-Alkyl, NO₂ und/oder C₁-C₄-Alkoxy substituiertes Phenyl oder C₇-C₉-Phenylalkyl darstellt, durch Claisen-Kondensation von Ketonen der Formel III



mit Estern der Formel IV



worin R_5 für C_1 - C_5 -Alkyl, Phenyl, oder durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl oder Hydroxy substituiertes Phenyl steht; oder, wenn R_2 in Formel I $-(\text{CH}_2)_m\text{OH}$ bedeutet, auch mit cyclischen Estern der Formel V



in der m 2 bis 10 bedeutet, in Gegenwart eines Alkali- oder Erdalkalimetallhydrids oder C_1 - C_5 -Alkali- oder Erdalkalimetallalkoholats als Base, dadurch gekennzeichnet, dass man die Umsetzung in einem inerten organischen Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch, in denen die Base zu mindestens 8 % löslich ist, durchführt, wobei das Lösungsmittel(gemisch) kein Dimethylsulfoxid ist (enthält) und das Lösungsmittel nicht aus einem Alkohol besteht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, worin als Basen C_3 - C_5 -Alkalimetallalkoholate verwendet werden.
3. Verfahren nach Anspruch 2, worin die verwendeten Basen Natrium-n-butylat, Natrium-tert-butylat oder Natriumamylat sind.
4. Verfahren nach Anspruch 1, worin die Base in den verwendeten Lösungsmitteln oder Lösungsmittelgemischen zu mindestens 10 % löslich ist.
5. Verfahren nach Anspruch 1, worin die inerten organischen Lösungsmittel cyclische oder lineare Ether oder lineare oder cyclische Amide sind.
6. Verfahren nach Anspruch 5, worin die organischen inerten Lösungsmittel lineare oder cyclische Ether sind.
7. Verfahren nach Anspruch 6, worin die organischen inerten Lösungsmittel cyclische Ether oder Methyl-tert-butylether sind.
8. Verfahren nach Anspruch 1, worin R_1 und R_2 unabhängig voneinander C_1 - C_{20} -Alkyl, Phenyl, $(\text{C}_1$ - C_4 -Alkyl)-phenyl oder einen Rest der Formel II bedeuten, A für C_1 - C_6 -Alkylen steht, R_4 Wasserstoff, C_1 - C_{18} -Alkyl, Phenyl oder $(\text{C}_1$ - C_4 -Alkyl)-phenyl darstellt und R_3 für Wasserstoff und C_1 - C_4 -Alkyl steht.
9. Verfahren nach Anspruch 8, worin R_1 und R_2 unabhängig voneinander C_1 - C_{18} -Alkyl, Phenyl oder einen Rest der Formel II bedeuten, R_4 Wasserstoff, Phenyl oder C_1 - C_{18} -Alkyl darstellt und R_3 für Wasserstoff steht.
10. Verfahren nach Anspruch 9, worin R_1 und R_2 Phenyl oder einen Rest der Formel II bedeuten, R_4 Phenyl und X O bedeuten.
11. Verfahren nach Anspruch 1, worin die Claisen-Kondensationsreaktion bei Temperaturen zwischen -20 und $+70^\circ\text{C}$ durchgeführt wird.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 91810290.6
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
X	DE - A1 - 3 302 123 (HAARMANN & REIMER GMBH) * Seiten 7,8 *	1,5,6	C 07 C 45/72 C 07 C 45/45 C 07 C 49/76
X	US - A - 4 387 089 (KARL-FRED DE POLO) * Spalte 2, Zeile 60 - Spalte 3, Zeile 30 *	1,5-7 11	
X	DE - A1 - 2 439 282 (GENERAL MILLS CHEMICALS) * Seite 4, Zeile 10 - Seite 10, Ende des Beispiels L *	1,5-7	
D,A	FR - A - 1 202 737 (CHEMISCHE WERKE HÜLS) * Patentanspruch; Beispiel 4 *	1	
D,A	US - A - 3 004 932 (ALEKSANDER DESPIC et al.) * Patentansprüche 1,4 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)
			C 07 C 45/00 C 07 C 49/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 01-08-1991	Prüfer REIF
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPA Form 1503 03 82